

# KLYDEN

*Klyden kommer til Vadehavet i begyndelsen af marts fra det sydlige Europa. Herefter kan de gå på de blotlagte mudderbanker i store flokke og finde føde. Man kan se den frem til september/oktober.*

## UDSEENDE

Klyden er meget karakteristisk med sin sorthvide fjerdragt, sit lange opadbøjede næb og meget lange gråblå ben. Den er cirka på størrelse med en allike.

## ALDER

Klyden kan blive op til 25 år.

## ÆG/UNGER

Klyden lægger 2-4 æg, og allerede når ungerne kommer ud af æggene, kan de selv løbe rundt og finde føde.

## FØDE


Når klyden søger føde, svinger den sit hoved fra side til side, således at den med næbbet nærmest fejer i vandet og filtrerer det for spiselig ting. Her finder den krebsdyr, dyndsnegle og lignende. Under fødesøgningen kan klyden svømme, hvilket er ualmindeligt hos vadefuglene. Den er en af de få vadefuglearter, som har svømmehud mellem tæerne.

## LEVESTED

Den yngler på rævefri øer og på strandenge. Efter yngletiden samler fuglene sig bl.a. i Ho Bugt og ved Rømødæmningen, hvor de ved lavvande søger føde og ved højvande står og hviler på højvandsrasteplasserne i store tætte flokke, som giver et fantastisk skue i sort og hvidt.

## FJENDER

Klydens største fjender er ræve, mink og mårhund. Især når klyden yngler på strandenge er den udsat for angreb fra disse dyr. De er alle gode svømmere og nemt kan komme ud til ynglerne.



### Ekstra information

For at forsvare sin rede og sine unger spiller klyden syg. Den lader som om den har brækket sin vinge, så den ikke kan flyve. Derved opnår den, at rovdyret vil interessere sig mere for forældrefuglen end for æggene eller ungerne. Når den har fået fx en ræv væk, og ræven nærmer sig "den syge" fugl, letter den og flyver væk. Det samme skuespil opleves, hvis mennesker nærmer sig yngleområdet.

